

新冠病毒疫苗接种指南 (중국어)

<接种前一天>

01. 确认新冠病毒疫苗接种通知短信

- 收到新冠病毒疫苗接种预约通知短信后，再次确认疫苗接种场所和时间。

为避免遇上交通堵塞和停车问题，请确认交通路线，尽量利用公共交通前往疫苗接种场所。

疫苗接种部位是胳膊的上臂三角肌外侧，接种疫苗前一天准备好易于露出上臂的宽袖上衣

<接种疫苗当天>

02. 从家里出发前

- 自查今天的身体状况。如果发烧，暂缓接种疫苗。
- 穿上准备好的宽袖衣服，佩戴好口罩，然后出发去接种疫苗。
- 提前30分钟到达疫苗接种场所。

03. 到达疫苗接种场所

- 到达疫苗接种场所后，出示身份证或疫苗接种短信等，确认疫苗接种预约事项。
- 测量体温后进入疫苗接种等候大厅。

04. 填写预诊表

- 仔细填写预诊表不要漏填。

05. 预诊 (医生咨询)

- 与预诊医生商谈咨询。

咨询有关对新冠病毒疫苗接种的疑问。

06. 接种疫苗

- 去接种室接种新冠病毒疫苗。

07. 在观察室留观

- 接种疫苗后为防止发生异常反应，需在观察室留观15~30分钟。

08. 回家

- 在观察室留观后，尽量马上回家休息，避免劳累。
- 在日历上标明第二次疫苗接种日期。

09 回家后

- 接种疫苗后，可能会发生如下常见症状，这些症状是在形成免疫过程中可能出现的反应，大部分在2~3天内消失。

预防接种后 常见症状与 处置方法	区分	预防接种部位	全身
	症状	·疼痛 ·肿胀	·发烧 ·发冷 ·疲倦 ·头痛
	处置	·将干净的毛巾凉湿后，冷敷相应部位。 ·做胳膊运动或多动手臂	·充分摄取水分并休息 ·衣服穿得轻便舒适
		·原则上不限制服用解热·止疼药，但建议尽可能服用没有消炎效果的含乙酰氨基酚成分的医药品。	·接种疫苗前提早准备 解热·止疼药

- 大部分情况下服用解热·止疼药后症状会好转，但如果接种部位持续2天以上出现浮肿、疼痛、红肿等症状的话请务必接受医生的诊疗。
- 如出现伴随呼吸困难、无意识、面部浮肿等症状的严重过敏反应（过敏性反应等），请立即拨打119或到附近的急诊室就诊。

《由Danuri1577-1366提供翻译。》